

Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link

Por Jonay Cubas

Conocido como escobón o tagasaste, este endemismo canario es característico del ecosistema del pinar, presente desde los 400 hasta los 1.800 m, aunque también lo podemos encontrar en zona de mayor altitud; asimismo, lo podemos ver tanto en laderas como en cauces de barrancos. Se trata de un arbusto de la familia de las leguminosas (Fabaceae) que puede superar los siete metros de alto, con hojas trifoliadas y flores agrupadas de color blanco. Presente en las islas centro-occidentales del archipiélago canario, esta especie cuenta con tres subespecies: *C. proliferus* subsp. *proliferus* (en todas las islas citadas), *C. proliferus* subsp. *angustifolius* (Kuntze) G. Kunkel (en La Gomera y Tenerife) y *C. proliferus* subsp. *meridionalis* Acebes (en Gran Canaria).

Aunque en la actualidad no presenta ningún grado de protección, esta especie fue muy castigada en el pasado a consecuencia de su intenso aprovechamiento como planta forrajera, constatándose que forma parte de la dieta de arruís, cabras y conejos (herbívoros introducidos invasores), lo que ha provocado la consiguiente merma de sus poblaciones naturales. Todo ello nos lleva a pensar que, posiblemente, esta especie debió ocupar amplias áreas del matorral asociado al pinar en tiempos pretéritos.

