Collartida anophthalma Español & Ribes, 1983

Por Pedro Oromí

Las chinches de la familia Reduviidae (Insectos, Hemípteros) incluye algunas especies tropicales hematófagas de vertebrados, pero la gran mayoría son predadoras de otros invertebrados. En Canarias hay unas 20 especies, entre ellas dos del género Collartida exclusivas del medio cavernícola: *C. anophthalma* Español & Ribes, 1983 endémica de El Hierro, y *C. tanausu* Ribes, Oromí & Ribes, 1998 de cuevas de La Palma. Su estilizado cuerpo despigmentado, sus largos apéndices y su carencia de ojos denotan su gran adaptación a las extremas condiciones del medio subterráneo, producto de dos procesos evolutivos paralelos acaecidos independientemente en cada una de las dos islas. Además, tienen un alto interés biogeográfico dado que las demás especies del género, que no son cavernícolas, se encuentran en África Ecuatorial y Oriental llegando hasta Israel, pudiéndose considerar las especies canarias como relictos cuyos ancestros desaparecieron tanto en nuestro archipiélago como en la zona paleártica de África. En el Catálogo Canario de Especies Amenazadas *Collartida tanausu* está catalogada como especie "de protección especial", y *C. anophthalma* como "de interés para los ecosistemas canarios".