

Las lisas de Canarias

Por Juan Carlos Rando

Las lisas del género *Chalcides* (reptiles de la familia Scincidae) tienen su origen en el norte de África desde donde se expandieron hacia el sur de Europa, Asia y Canarias. Poseen extremidades relativamente cortas y el cuerpo cubierto de pequeñas escamas brillantes imbricadas lo que les confiere un aspecto liso, de donde toman su nombre. Son carnívoras que consumen pequeños invertebrados y a diferencia de otros reptiles son vivíparas, es decir, en lugar de poner huevos paren a sus crías vivas.

La distribución natural de estos reptiles en Canarias comprende las islas principales del archipiélago excepto La Palma. Las cuatro especies endémicas que habitan las islas son el resultado de dos colonizaciones. La primera de ellas tuvo lugar hace unos 7 millones de años (ma) dando lugar a la lisa variable (*C. sexlineatus*) que habita Gran Canaria, a la lisa dorada (*C. viridanus*) en Tenerife y la lisa de Salvador (*C. coeruleopunctatus*) en La Gomera. Tras su aparición como isla, hace aproximadamente 1 ma, El Hierro fue colonizado desde La Gomera, por lo que ambas islas comparten la misma especie. Gran Canaria es la única isla que presenta dos subespecies *C. s. sexlineatus* en la mitad suroeste y *C. s. bistriatus* en la mitad noreste. Esta diferenciación tiene su origen en los episodios volcánicos acaecidos en la isla hace 1,5-3 ma. Una segunda colonización africana afectó a las islas de Lanzarote y Fuerteventura hace unos 5 ma dando origen a la lisneja (*C. simonyi*).

En la Palma no habitan lisas de forma natural, pero debido el intenso tráfico de personas y mercancías, en esta isla se han detectado introducciones de ejemplares de las especies de Tenerife y Gran Canaria.

