Accipiter nisus (Gavilán común)

Por Aurelio Martín

Rapaz eminentemente forestal, está presente en gran parte de Europa y Asia así como en el noroeste de África. En los archipiélagos macaronésicos solo habita en Madeira y Canarias donde está representado por la subespecie *A. n. granti*.

En Canarias se distribuye por las islas centrales y occidentales, si bien en las islas e islotes orientales pueden observarse ejemplares migratorios. Es una especie típica de los bosques de laurisilva y pinar canario, aunque también ocupa repoblaciones de pino insigne y no desdeña los pequeños bosquetes de cipreses. Para cazar, también visita zonas de cultivos.

Ambos sexos presentan un acusado dimorfismo en tamaño y coloración. La talla del macho es parecida a la de un cernícalo mientras que la hembra es considerablemente mayor; el macho (en la fotografía) muestra el dorso de color gris-plomizo y características manchas ventrales ocres, mientras que la hembra es parda dorsalmente y de color blanquecino en las partes ventrales.

Su dieta es ornitófaga, cazando aves desde el tamaño de un mosquitero hasta el de una paloma. Sin embargo, canarios y mirlos son los más frecuentemente depredados. Nidifica en árboles, a considerable altura, y sus puestas habituales son de 3-4 huevos.

Es una especie común incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas.