

Gymnothorax bacalladoi (Böhlke & Brito, 1987)

Por Alberto Brito

El Murión atigrado es una morena costera (1-20 m de profundidad), de pequeño tamaño (50 cm) y difícil de observar, que se distribuye por las Canarias occidentales, Madeira e Islas de Cabo Verde, descubierta en 1986 y dedicada al profesor Juan José Bacallado, un importante investigador de la fauna canaria. Aparte de por su color atigrado, esta morena se distingue por la presencia en la cabeza de dos llamativos poros suborbitales bordeados de blanco. Se alimenta sobre todo de crustáceos y es activa principalmente de noche. No tiene interés pesquero.

Los estudios genéticos señalan que está emparentada con *Gymnothorax maderesis*, el Murión-Morena verde, la otra especie atlántica de dientes aserrados, que presenta una amplia distribución a ambos lados del Atlántico tropical y subtropical. La Morena verde es muy frecuente en Canarias, vive en los fondos profundos (170-300 m), alcanza mayor tamaño (130 cm) y es muy valorada por su calidad; su nombre se debe al particular color verde clorofila que presenta recién capturada.

El origen de *G. bacalladoi* representa un caso de especiación muy particular entre las morenas, probablemente relacionado con el uso de diferentes nichos, aunque esta hipótesis no está resuelta todavía.

