

Streptopelia decaocto (tórtola turca)

Por Aurelio Martín

Originaria de Asia meridional, durante el siglo XX experimentó una notoria expansión hacia occidente colonizando toda Europa hasta llegar a Inglaterra en la década de 1950 y a la península ibérica en la década de 1970.

Su presencia en Canarias y los restantes archipiélagos macaronésicos es relativamente reciente y está relacionada con su expansión por Marruecos a partir de mediados de la década de 1980.

En Canarias se inició la colonización en las islas orientales a principios de la década de 1990 finalizando en La Palma y El Hierro sobre 1998.

Actualmente es una especie abundante y bien conocida por la gente en parques y jardines de pueblos y ciudades de todo el archipiélago. Fácil de diferenciar de las otras tórtolas existentes en Canarias salvo de la tórtola rosigrís (*Streptopelia risoria*). Esta última, algo más pequeña, presenta varias formas domésticas que solían ser mantenidas en cautividad hasta que se produjeron escapes o liberaciones en la década de 1980, observándose en la actualidad algunos híbridos entre ambas especies.

Se alimenta sobre todo de semillas pero también consume algunos frutos y desperdicios en terrazas de restaurantes. El nido es una estructura de ramas poco elaborada que tras sucesivas puestas aumenta de volumen; suele estar situado en palmeras y en distintos árboles exóticos, normalmente a más de 6 metros de altura. Como en casi todos los colúmbidos la puesta habitual es de dos huevos.

