

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja)

Por Félix Manuel Medina

También conocida como graja en Canarias, actualmente solo se encuentra en la Palma aunque en el pasado también estuvo presente en Tenerife, La Gomera y, probablemente, en El Hierro. Es una especie de córvido que se caracteriza por su color negro casi metálico y pico y patas de color rojo intenso.

Se alimenta básicamente de invertebrados, incluyendo una gran cantidad de insectos, pero también consumen numerosos frutos, tanto de especies nativas como tasaigos, espineros o hediondos como de frutales (higueras, tunera, viñas o moreras).

Ocupa todos los hábitats de la isla, desde los acantilados costeros hasta el matorral de alta montaña, aunque es algo menos habitual verlas en las zonas de laurisilva. Nidifica en cantiles elevados de los profundos barrancos del interior de la isla así como en acantilados costeros, donde encontramos sus colonias de cría más importantes.

Su población se estima en unas 2500 aves aunque el último censo de la población tuvo lugar en 2010 y ya se requiere de una nueva estima de su población con el fin de conocer su evolución que, hasta ese momento, se mantendría más o menos constante (sobre 2600 aves censadas en 2005).

Los principales problemas de conservación que pesan sobre sus poblaciones son la destrucción y fragmentación del hábitat, el abandono de la agricultura, el mal uso de pesticidas, así como la caza ilegal y el expolio de nidos. Estos factores, así como el desconocimiento de ciertos aspectos de su biología y ecología en la isla hacen que desarrollar una efectiva campaña divulgativa y de concienciación sea una herramienta imprescindible para dar a conocer esta emblemática especie de la avifauna canaria.

