

*Canarina canariensis* (L.) Vatke. (Bicácaro o Bicacarera)

Por Juan Montesino

Pertenece a la familia Campanulaceae y es un endemismo canario de la Laurisilva, de áreas circundantes y de terrenos donde talaron estos montes. Es planta trepadora cuyos tallos alcanzan varios metros creciendo a ras del suelo o sobre helechos, ramas de árboles o matas del sotobosque.

Sus tallos huecos y frágiles se renuevan todos los años desde una raíz tuberosa, brotando de la tierra desde el mes de Octubre-Posviembre. Las hojas verde-glaucas son opuestas, pecioladas, de borde dentado y de forma triangular hastada, más claras en el envés.

Las flores acampanadas, que crecen en las axilas de las hojas en la porción distal de los tallos, desde el mes de Diciembre, son rojas o anaranjadas y producen un dulce y sabroso néctar que lo usan múltiples animales, desde pájaros hasta lagartos. El cáliz y la corola tienen seis lóbulos; los lóbulos del cáliz pueden ser de borde dentado.

El ovario ínfero crece y madura cuando la flor se ha secado, formando una baya carnosa con múltiples semillitas y es comestible. Seguramente sería uno de los frutos que comían también los antiguos canarios.

Para muchos, es la Flor de Canarias, una maravilla atractiva y vistosa, endémica de las islas occidentales: GC, TF, G, P y H.

