

Volutaria tubuliflora (Cardomanso de burro)

Por Stephan Scholz

En Canarias, esta especie anual fue confundida mucho tiempo con *V. lippii*, una planta mediterráneo-norteafricana bastante parecida pero que al parecer no se encuentra en nuestras islas. *V. tubuliflora*, en cambio, también una planta mediterráneo-norteafricana, sí está presente, al menos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro. Podría tratarse de una introducción relativamente reciente.

V. tubuliflora suele alcanzar 1 m o un poco más de altura y es frecuente en bordes de carretera y campos incultos. De hecho, parece ser una especie en expansión que se ve cada vez en mayor número de localidades e individuos. Los capítulos florales siempre son de color morado o violeta oscuro y las hojas presentan un grado de división bastante variable, con lóbulos terminales frecuentemente algo redondeados.

En Fuerteventura *V. tubuliflora* es abundante en los bordes de algunos tramos de carretera del centro y del norte de la isla, pero puede aparecer localmente también alejada de las vías de comunicación, como una población que se desarrolla en inviernos lluviosos en la cima de Montaña Hendida, no lejos de Montaña Cardón, a unos 380 m de altitud.

Se ha citado también para Fuerteventura *Volutaria canariensis*, el cardomanso canario, pero en 34 años que llevamos estudiando la flora de la isla mayorera nunca hemos encontrado allí a esta especie. En cambio, ésta sí es abundante en las áreas costeras del este y sureste de Tenerife, desde San Andrés pasando por las inmediaciones de Santa Cruz hasta al menos el valle de Güimar, y la hemos visto también con frecuencia en las medianías del sureste de Gran Canaria. Se trata de una planta generalmente de menor estatura que *V. tubuliflora*, con hojas mucho más finamente divididas y pelosas, y capítulos florales pequeños de color blancuzco.

Nuestra foto del cardomanso de burro fue tomada el 24 de abril de 2018 en La Lajita, Fuerteventura.

