ACBC
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CANARIA

por Ángel Bañares Baudet

Galerina rebordeada
Galerina marginata (Batsch) Kühner

Las especies del género *Galerina* presentan un escaso porte de tipo "micenoide" (semejante a *Mycena*), de sombrerillo generalmente menor de 1-2 cm de diámetro, típicamente cónico o campanulado, pardo-anaranjado, amarillo-miel, ocráceos, de superficie grasienta o víscida, a veces higrófano (cambia de color o pierde intensidad con la humedad), y con el margen a menudo estriado por transparencia. El estípite presenta en algunas especies un anillo muy notorio en el tercio apical donde exhibe un indumento muy fino, como polvo blanquecino (pruina), el resto es fibriloso. La esporada es pardo ferruginosa (como en *Cortinarius*, *Pholiota*), y las esporas verrucosas. Viven sobre pequeños restos leñosos en ambientes forestales, parte de ellas asociadas a briófitos (muscícolas). Son cosmopolitas con amplia diversidad en áreas frías y templadas del hemisferio norte. De las 250 especies descritas solo medio centenar están en la península Ibérica y una decena en Canarias.

Dado su reducido tamaño, no tienen interés culinario. Por el contrario, hemos de tener mucha cautela con las especies de hábitat lignícola que presentan anillo en el pie, como es el caso que nos ocupa, por ser muy venenosas si las ingerimos.

Galerina marginata destaca por su porte robusto, con un píleo de hasta 4 cm de diámetro. Es de color ocre anaranjado o amarillento, y las láminas pardo-ocráceas se adhieren a la parte superior del pie que es más oscuro. El anillo es membranoso ocráceo o parduzco, más o menos persistente, con tonalidades ferruginosas por el depósito de

la esporada. El pasado otoño pude observarla en bosque mixto de pinar y fayal-brezal, formando colonias sobre ramillas y madera en descomposición de *Pinus canariensis*. También puede encontrarse en plantaciones de *Pinus radiata*, a veces en tierra con madera enterrada muy descompuesta, aparentando hábitat terrícola.

De las 6 especies venenosas conocidas del género en España, solo *Galerina marginata* y *Galerina badipes* están citadas para Canarias, siendo ésta bastante parecida e igualmente peligrosa. Se diferencia por no presentar anillo sino una zona anular floconosa (revestida por finos copos). El cuadro de intoxicación, relativamente lento pues se produce a partir de unas 4 horas, lo provocan amanitotoxinas o amatoxinas que conducen al síndrome ciclopeptídico o faloideo que puede ser mortal. De hecho, este síndrome fúngico, provocado también por otras especies de los géneros *Amanita* y *Lepiota*, es el mayor causante de muertes en Europa.